


SOSPECHA VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL

CENTRO DE SALUD

Diligenciar :
- Ficha epidemiológica.
- Historia clínica completa.
- Remisión y traslado ambulancia.

URGENCIAS



Triage I
- Evento ocurrido en las primeras 72 horas.
- ó comportamiento depresivo e ideaciones suicidas, sangrado vaginal o uretral severo secundario a trauma, retraso mensual con sangrado vaginal y dolor severo, agitación psicomotora, confusión, alucinaciones.

Triage II
Evento ocurrido después de las 72 horas.

ACTIVAR CÓDIGO FLUCSIA



¿Menor de Edad?



Directorio Telefónico
Policía de Judicial (CTI, URI): Tel. 036 .7443672
CAIVAS:
Tel. 036 7446184
Cel. 3168701244

Notificar a:
- Llamada inmediata a Policía Judicial URI, CTI Y/O CAIVAS.
- Oficio radicado a Comisaría.
- Correo electrónico a la aseguradora.

Notificar a:
- Llamada inmediata a Policía de Infancia y Adolescencia, ICBF (acompañamiento permanente o sustitutivo).
- Oficio radicado a ICBJ.
- Correo electrónico a la aseguradora.



Directorio Telefónico
Policía de Infancia y Adolescencia: 314 832 6288; 036 746 6111; 036 747 2253.
ICBF: Tel. 018000112440 Ext 123 ó 106. Tel. 036 7457901, Ext 610000. Línea especial de atención a la violencia 741

Estabilización Física, Mental y Emocional al Paciente Víctima

ANAMNESIS

Realizar:
- Consentimiento Informado.
- Educar al paciente y familia.
- Respeto por decisiones y autonomía.

Realizar Examen Físico y Mental Completos

Entrega de Material Probatorio a Policía Judicial.



Tomar Muestras Forenses, Embalaje y Cadena de Custodia

Ordenar y Tomar Paraclínicos

Realizar:
- Prueba rápida VIH. // Prueba rápida Sífilis.
- Prueba Subunidad beta-hCG. // Frotis vaginal.
- *AgS HB - *Acs contra AgsHB si ha sido vacunado (a).
- *Acs contra Hepatitis C.
- *Toma endocervical para gram y cultivo en Agar Chocolate o Thayer Martín para detectar gonococo.
- *Prueba rápida de Chlamydia o Elisa.

Realizar Profilaxis Según Clasificación de Violencia Sexual y Ofertar IVE

| Profilaxis Menores 30 Kg | | | |
|--|---|---|-------------------|
| TIPO PROFILAXIS | MEDICAMENTO | DOSIS | TIEMPO |
| Profilaxis del VIH | ZIDOVUDINA Susp 10 mg/ml | Oral: 180-240 mg/m2/dosis, 2 veces al día (dosis diaria total de 360-480 mg/m2) Dosis máxima: 300 mg/dosis, 2 veces al día | 28 Días |
| | LAMIVUDINA Susp 10 mg/ml | 4mg / Kg. Dos veces al día. | 28 Días |
| | LOPINAVIR / RITONAVIR Susp 80/20 mg/ml | Dosis proyectadas ** | 28 Días |
| Profilaxis de Hepatitis B | Vacuna contra la Hepatitis B* | depende de la presentación disponible, en promedio se acepta 0.12 a 0.20 ml/kg ** | Completar esquema |
| | Inmunoglobulina G contra Hepatitis B* | Si la persona está vacunada pero no se sabe su nivel de AC, solicitar Anticuerpos y valorar la necesidad de un refuerzo. ** | Completar esquema |
| Profilaxis de otras ITS Antibióticos de amplio espectro para Sífilis, Gonorrea, Clamidia, Tricomonas, Linfogranuloma venéreo, | CEFUROXIMA. Suspensión 250mg/5 cc, Fco x 70ml | 10 mg/Kg. | Dosis única |
| | AZITROMICINA. Suspensión 200mg/ 5ml, Fco x 15 ml | 10 mg/Kg. | Dosis única |
| | METRONIDAZOL. Suspensión 250mg/5 cc, Fco x 120 ml | 10 mg/Kg. | Dosis única |
| Anticoncepción de Emergencia | Levonorgestrel x 0,75mg | 1,5 mg Dosis única | Dosis única |

** Ver Manual de Violencia Sexual - Sección de Profilaxis
* En mujeres embarazadas, reemplazar la Azitromicina por Eritromicina (50 mg/kg/día repartida en 3 tomas, por 7 días) o Amoxicilina (50 a 100 mg/kg/día, dividida en tres tomas, por 7 días). Evitar el Metronidazol en el primer trimestre del embarazo.

Diligenciar Ficha Epidemiológica

- Pedriatría: <14 años
- Gineco / obstetricia
- Psicología
- Psiquiatría

Remisión:

SEGUIMIENTO

- 02 Semanas
- 04 Semanas
- 03 Meses
- 06 Meses
- 12 Meses

- Trabajo Social y/o SIAU: (Programación)
- Enfermera y/o Médico: (Seguimiento)

CIERRE DE CASO

